



## ACÉTAZOLAMIDE suspension orale 25 mg/mL

Ingrédients	Quantité
Acétazolamide 250 mg/comprimé	10 comprimés
Ora-Blend	qs ad 100 mL

Matériel
Mortier et pilon
Cylindre gradué
Tige de verre

### Procédure

- Triturer les comprimés dans le mortier pour obtenir une poudre fine.
- Mouiller la poudre avec une petite quantité du véhicule de suspension pour obtenir une pâte épaisse.
- Incorporer graduellement une partie du véhicule de suspension dans le mortier et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension uniforme.
- Transférer la suspension dans le cylindre gradué et utiliser environ 15 mL du véhicule restant pour rincer le mortier, puis vider dans le cylindre. Répéter l'opération.
- Compléter jusqu'au volume désiré avec le véhicule et agiter la suspension avec une tige de verre pour l'homogénéiser.
- Transvider le mélange dans une bouteille ambrée.

### Stabilité

60 jours

### Conservation

Température pièce (ou réfrigérateur)

### Remarques

Protéger de la lumière.

Bien agiter avant usage.

L'Ora-Blend peut être substitué par Ora-Sweet/Ora-Plus (1 :1).

### Références

- Taketomo CK, et al. Pediatric Dosage Handbook. 19th ed. Hudson, OH: Lexi-Comp, Inc, 2012-13.
- The Hospital for Sick Children-Department of Pharmacy. Compounding Service. <http://www.sickkids.ca/pharmacy/compoundingservice/index.html>
- Nahata MC, et al. Pediatric Drug Formulations. 6th ed. Cincinnati, OH: Harvey Whitney Books Co, 2011.
- Allen LV, et al. Stability of acetazolamide, allopurinol, azathioprine, clonazepam and fluocytosine in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health Sys Pharm 1996; 53(16) :1944-9.

### Révision

Juin 2022