



AMILORIDE suspension orale 1 mg/mL

Ingrédients	Quantité
Amiloride 5 mg/comprimé	10 comprimés
Glycérine	20 mL
Eau stérile pour irrigation	qs ad 50 mL

Matériel
Mortier et pilon
Cylindres gradués
Tige de verre

Procédure

- Triturer les comprimés dans le mortier pour obtenir une poudre fine.
- Mouiller la poudre avec la glycérine pour obtenir une pâte épaisse.
- Incorporer graduellement une partie de l'eau stérile dans le mortier et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension uniforme.
- Transférer la suspension dans le cylindre gradué et utiliser environ 15 mL d'eau stérile pour rincer le mortier, puis vider dans le cylindre. Répéter l'opération.
- Compléter jusqu'au volume désiré avec l'eau stérile et agiter la suspension avec une tige de verre pour l'homogénéiser.
- Transvider le mélange dans une bouteille ambrée.

Stabilité

21 jours

Conservation

Réfrigérateur

Remarques

Bien agiter avant usage.

Références

- Nahata MC, et al. Pediatric Drug Formulations. 7th ed. Cincinnati, OH : Harvey Whitney Books Co, 2018.

Révision

Janvier 2022