



AMITRIPTYLINE suspension orale 20 mg/mL

Ingrédients	Quantité
Amitriptyline 100 mg/comprimé	20 comprimés
Ora-Blend	qs ad 100 mL

Matériel
Mortier et pilon
Cylindre gradué
Tige de verre

Procédure

- Triturer les comprimés dans le mortier pour obtenir une poudre fine.
- Mouiller la poudre avec une petite quantité du véhicule de suspension pour obtenir une pâte épaisse.
- Incorporer graduellement une partie du véhicule de suspension dans le mortier et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension uniforme.
- Transférer la suspension dans le cylindre gradué et utiliser environ 15 mL du véhicule restant pour rincer le mortier, puis vider dans le cylindre. Répéter l'opération.
- Compléter jusqu'au volume désiré avec le véhicule et agiter la suspension avec une tige de verre pour l'homogénéiser.
- Transvider le mélange dans une bouteille ambrée.

Stabilité

91 jours

Conservation

Température pièce (ou réfrigérateur)

Remarques

Protéger de la lumière.

Bien agiter avant usage.

Ora Blend peut être substitué par Ora Sweet/Ora Plus (1 :1).

Références

- Nahata MC, et al. Pediatric Drug Formulations. 7th ed. Cincinnati, OH : Harvey Whitney Books Co, 2018.
- Nahata MC. Long-term stability of zonisamide, amitriptyline, and glycopyrrolate in extemporaneously prepared liquid-dosage forms at two temperatures. Int J Compd 2016; 20(2):164-6
- Amitriptyline 20 mg/mL suspension orale (préparation magistrale). Dans : RxVigilance (Octobre 2021) [Logiciel]. Repentigny (Québec) : VIGILANCE SANTÉ INC. [Consulté le : 2022-01-25]

Révision

Juin 2022