



## APREPITANT suspension orale 20 mg/mL

Ingrédients	Quantité
Aprepitant 125 mg/capsule	16 capsules
Ora-Blend	qs ad 100 mL

Matériel
Mortier et pilon
Cylindre gradué
Tige de verre

### Procédure

- Vider le contenu des capsules dans le mortier.
- Triturer le contenu des capsules dans le mortier pour obtenir une poudre fine.
- Mouiller la poudre avec une petite quantité du véhicule de suspension pour obtenir une pâte épaisse.
- Incorporer graduellement une partie du véhicule de suspension dans le mortier et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension uniforme.
- Transférer la suspension dans le cylindre gradué et utiliser environ 15 mL du véhicule restant pour rincer le mortier, puis vider dans le cylindre. Répéter l'opération.
- Compléter jusqu'au volume désiré avec le véhicule et agiter la suspension avec une tige de verre pour l'homogénéiser.
- Transvider le mélange dans une bouteille ambrée.

### Stabilité

90 jours

### Conservation

Réfrigérateur

### Remarques

Protéger de la lumière.

Bien agiter avant usage.

Ora Blend peut être substitué par Ora Sweet/Ora Plus (1 :1).

### Références

- Nahata MC, et al. Pediatric Drug Formulations. 6th ed. Cincinnati, OH : Harvey Whitney Books Co, 2011.
- Dupuis LL, et al. Support Care Cancer 2009;17 :701-6.

### Révision

Juin 2022