

CRITÈRES DE SUIVIS DE LA CLINIQUE NÉONATALE

La Clinique néonatale suit les patients qui présentent des facteurs de risque de retard neurodéveloppemental lors de leur congé de l'Unité de Soins Intensifs Néonataux (USIN). Les critères suivants sont **un guide**.

CRITÈRES MAJEURS

Ces critères sont en lien direct avec l'expertise de niveau III de notre USIN

- Prématurité : âge gestationnel de moins de 29 semaines
- Encéphalopathie Hypoxique Ischémique/Asphyxie (EHI) de niveau :
 - Modérée (Sarnat 2 modifié) ou sévère (Sarnat 3 modifié) ayant reçu ou non l'hypothermie thérapeutique (considérer le pire niveau atteint)
 - Légère (Sarnat 1 modifié) si l'examen neurodéveloppemental ou l'imagerie sont anormaux ou si le patient fait partie d'un projet de recherche clinique
- Dysplasie broncho-pulmonaire oxygène-dépendant
- ECMO (oxygénation par membrane extra corporelle)
- Chirurgie à cœur ouvert avant l'âge de 3 mois
- Programme d'alimentation entérale à domicile, sauf les cas de pathologie digestive qui sont suivis en gastroentérologie et/ou soins complexes

CRITÈRES LOCAL SPÉCIFIQUE

- Triplets nés au CUSM (« INBORN »)

SÉQUENCE DES VISITES DE SUIVI NÉONATAL (en âge corrigé, si cela s'applique)

- 4m, 9m, 18m, 36m, et en préscolaire avant l'entrée en maternelle 5 ans.
Des visites supplémentaires peuvent se rajouter selon les besoins cliniques
- Pour les enfants suivis au programme d'alimentation parentérale, le suivi peut terminer à l'arrêt du gavage, si l'enfant n'a aucun autre critère de suivi

CRITÈRES MINEURS

ANTÉNATAL ET ACCOUCHEMENT

- Retard de croissance intra utérin (RCIU) : poids de naissance à moins de 3 déviation standard (voir les tableaux)

NEUROLOGIQUE

- Convulsions néonatales
- Microcéphalie

- Hémorragie intra ventriculaire de grade 3 ou 4
- Déficits sensoriels (visuel ou auditif), incluant les nouveaux nés référés par le programme de Dépistage Universel de la Surdit 
- Examen neurod veloppemental anormal au cong  (si hospitalis  plus de 48h)
- Anomalies neurologique radiologique significatives : l sions parenchymateuses, ventriculom galie persistante, leucomalacie p rивentriculaire, saignement sous dural ou sous arachno dien significatif

INFECTION

- M ningite (avec ou sans culture positive)
- Infection cong nitale (TORCH)

AUTRES

- Anomalies cong nitaux multiples, syndrome non connu, impliquant plusieurs suivis sp cialis s
- Certains syndromes g n tiques connus, associ s   des retards neurod veloppemental (trisomie 13, 18, Rubinstein-Taybi, Di George, CHARGE, etc.)
- Instabilit  h modynamique s v re (choc hypovol mique ou septique)
- Participation   un projet de recherche
- Autre situation exceptionnelle, apr s discussion avec l' quipe de suivi n onatal

S QUENCE DES VISITES DE SUIVI N ONATAL

- 4m, 9m, 18m et 36 m

Apr s 36m :

- Si l'examen neurod veloppemental est normal, l'enfant re oit son cong .
- Au besoin il pourra  tre revu sur une base clinique
- Si l'examen est anormal, le suivi peut continuer, selon le m decin
- Si l'enfant est suivi en centre de r adaptation, envisager un cong  de la clinique n onatale

Nous acceptons les consultations pour transfert de soin pour les enfants (pas n s au CUSM) avec les crit res Majeurs (CORE) de moins de 5 ans (avant l'entr e scolaire).
(Pour ce faire, requ te de consultation n cessaire et r sum  si disponible)

Les th rapeutes de notre  quipe multidisciplinaire (ergo, physio, orthophonie, audio, nutrition, psycho, travail social) ont aussi le privil ge de nous consulter (requ te n cessaire) pour des enfants de moins de 18 mois (<18 mo) pour lesquels il y a des besoins/questions neurod veloppementales.